

“

Muchos pacientes **oncológicos** tienen un alto riesgo de sufrir **náuseas y vómitos**<sup>1-2</sup>

”


## Pacientes de alto riesgo



**Akynzeo**<sup>®</sup>  
netupitant/palonosetron



Quimioterapia basada en Cisplatino



Quimioterapia basada en AC



Quimioterapia Moderadamente Emetógena + factores relacionados con los pacientes

Factores asociados a la quimioterapia y a los pacientes que influyen en (o aumentan) **el riesgo de NaVIQ**<sup>1-8</sup>

### Tratamiento:

- Emetogenicidad de la terapia<sup>9</sup>
- Quimioterapia combinada<sup>9</sup>
- Posología y administración<sup>5</sup>

### Paciente:

- Sexo femenino<sup>1-6-8</sup>
- Edad joven<sup>1-6-8</sup>
- Comorbilidades<sup>2-4</sup>  
Diabetes.  
Hipertensión.
- Consumo reducido de alcohol<sup>1-3-6-7</sup>
- Cinetosis<sup>5-7-8</sup>
- Medicación concomitante incluyendo opioides<sup>5-7-8</sup>
- Antecedentes de NaVIQ<sup>2</sup>
- Tipo de tumor<sup>4</sup>

Sin una prevención apropiada, **las NaVIQ pueden mermar gravemente la calidad de vida** de los pacientes<sup>1-8</sup>

